

Colelitiasis en el Ecuador*

Es la presencia de uno o varios cálculos (litos ó piedras) en la vesícula biliar.

Produciendo cambios en la digestión, y en órganos cercanos como hígado o páncreas.



3,1% de egresos hospitalarios para el 2017


3,1%

12345


2da causa de morbilidad general en el Ecuador 2017.

2,4:1

Relación Mujer:Hombre, para frecuencia diagnóstica de Colecistitis



Porcentaje de pacientes por genero en el 2017





1



Primera causa de morbilidad en mujeres.

Quinta causa de morbilidad en hombres.

5



1 Vesícula Biliar

2 Hígado: Lóbulo izquierdo

3 Hígado: Lóbulo derecho

4 Ángulo Hepático del Colon
(Intestino Grueso)

5 Duodeno
(Intestino Delgado)

6 Páncreas

7 Colédoco

Dr. Fernando Torres Jaramillo
FACS

Cirugía General y laparoscópica
Cirugía Bariátrica (Obesidad) -
Metabólica



+593 (9) 9 930 5350



+593 (2) 3 514301



Hospital de los Valles.
Consultorio 240
Cumbayá - Ecuador



info@cirujano.ec

colelitiasis

Escanéa
Código
Qr



www.cirujano.ec

